

BROMACHEM koncentrat

Bromadiolon 0,1-Prah

Rodenticidni koncentrat namenjen za pripremu, proizvodnju mamaca za kontrolu populacije glodara, za suzbijanje sivog pacova (*Rattus norvegicus*), crnog pacova (*Rattus rattus*), domačeg kućnog miša (*Mus musculus*) i poljskog miša (*Apodemus agrarius*) u domaćinstvu, javnim objektima i na farmama.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

BROMADIOLON 0,1-Prah ili BROMACHEM – tečni koncentrat pomešati sa hranjivim nosačem u odnosu 1 prema 19 za Prah, odnosno 1 prema 49 za tečni koncentrat, do postizanja homogene crveno obojene smeše.

ČUVANJE

Čuvati u originalnoj ambalaži na suvom i provetrenom mestu van domašaja dece !

MERE PREDOSTROŽNOSTI

Za vreme manipulacije sa preparatom zabranjeno je jesti, piti i pušiti.
Manipulaciju preparatom obavljati dalje, min. 5 metara od izvorišta, bunara i vodotokova.
Ne kontaminirati hranu, pribor za hranu ili površine na koje se hrana odlaže.

Za vreme manipulacije preparatom nositi odgovarajuću zaštitnu opremu, rukavice i odeću. Po potrebi nositi zaštitnu masku.
Nakon upotrebe a pogotovu pre jela oprati ruke i eksponiranu kožu.
Držati samo u originalnom pakovanju na bezbednom mestu van domašaja dece.
Sa neutrošenim količinama postupiti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (sl.gl RS 36/09) a sa praznom ambalažom u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (sl.gl RS 36/09).

PRVA POMOĆ I ANTIDOT

Čovek: obilna lavaža želuca, vitamin K1, transfuzija sveže krvi uz vitamin K1.
Životinje: ispiranje želuca i primena vitamina K1, infuzija glukoze i fiziološkog rastvora i transfuzija sveže krvi.

U SLUČAJU NEZGODE POTRAŽITI SAVET OD NACIONALNOG CENTRA ZA KONTROLU TROVANJA VMA, TELEFON (24 sata) 011 3608 440 i 011 3608 234.